日 薬 情 発 第 20 号
平成 21 年 5 月 19 日

都道府県薬剤師会会長　　殿

日本薬剤師会
会 長　児玉　孝

改正薬事法施行規則の施行に伴う薬局製造販売医薬品（薬局製剤）の取扱いについて

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、既にご承知の通り、本年 6 月 1 日より薬事法施行規則等の一部を改正する省令（平成 21 年 2 月 6 日厚生労働省令第 10 号）（以下、改正省令）が施行されます。また、日薬業発第 55 号でお伝えしましたとおり、5 月 8 日付で厚生労働省医薬食品局長より改正省令の運用に際しての通知が発出されています。

改正省令で薬局製造販売医薬品（以下、薬局製剤）は、医療用医薬品とともに「薬局医薬品」と規定され、販売方法、情報提供、陳列方法、製造業者・製造販売業者の遵守事項等が定められています。特に、販売時の情報提供については、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が、薬局内の情報提供を行う場所において対面で、必要事項を記録した書面を用いて説明することとされています。

薬局製剤についてはこれまでも、原料の入手、製造、検査、情報提供から販売に至る全過程に薬剤師が責任を持ち、十分な配慮をもって製造・販売されてきたところでありますが、今般、省令に規定されたことを鑑み、改めて省令及び通知の確認と遵守を貴会関係会員にご周知下さいますよう、お願いいたします。

なお、現在、本会担当委員会において、薬局製剤業務指針の改訂版（薬局製剤業務指針第 5 版）を作成中であり、本年 8 月中の発刊を予定しています。

別添として、改訂版への掲載を予定している、平成 18 年 5 月 10 日薬発第 0510001 号及び平成 21 年 1 月 27 日薬発第 0127003 号厚生労働省医薬食品局長通知により改正された品目の添付文書例を添付いたしますので、ご参照ください。

参考：改正薬事法施行規則（薬局製造販売医薬品関連部分の抜粋）

（薬局医薬品の販売等）
第十五条の五
薬局開設者は、薬局製造販売医薬品（令第三条第三号に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。）その他の一般用医薬品以外の医薬品（以下「薬局医薬品」という。）を販売し、又は授与する場合には、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、当該薬局において、対面で販売させ、又は授与させなければならない。

（薬局医薬品を販売等する場合における情報提供等）
第十五条の六
薬局開設者は、その薬局において薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。
2 薬局開設者は、前項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
一　当該薬局内の情報提供を行う場所（薬局等構造設備規則第一条第一項第十号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次条、第十五条の十三及び第十五条の十四において同じ。）において、対面で行わせること。
二　医薬品等を購入し、又は譲りうけようとする者における当該医薬品の使用が適正なものであること又は不適正なものとならないことを確認するための質問又は説明を行わせること。
三　次に掲げる事項を記録した書面を用いて説明を行わせること。
イ　当該医薬品の名称
ロ　当該医薬品の有効成分の名称（一般的名称があるものにあつては、その一般的名称。以下同じ。）及びその分量（有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨。以下同じ。）
ハ　当該医薬品の用法及び用量
ニ　当該医薬品の効能又は効果
ホ　当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
ヘ　その他当該医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

第十五条の七
薬局開設者は、その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者から相談があつた場合には、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。
2　薬局開設者は、前項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

一　当該薬局内の情報提供を行う場所において、対面で行わせること。
二　医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。

（薬局医薬品の陳列等）
第十五条の八
薬局開設者は、薬局医薬品を調剤室（薬局等構造設備規則第一条第一項第八号に規定する調剤室をいう。）以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない。ただし、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りではない。

第九十二条の三
薬局製造販売医薬品の製造販売業者である薬局開設者は、当該薬局以外の薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に対して、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与してはならない。

（薬局製造販売医薬品の製造業者の遵守事項）
第九十六条の二
薬局製造販売医薬品の製造業者である薬局開設者は、当該薬局で調剤に従事する薬剤師に当該薬局における設備及び器具をもつて、薬局製造販売医薬品を製造させなければならない。
2　薬局製造販売医薬品の製造業者である薬局開設者は、当該薬局以外の医薬品の製造販売業者又は製造業者に対して、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与してはならない。

見本

解熱鎮痛薬

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

○○薬局　解熱鎮痛剤1号Ａ

解熱鎮痛剤１号Ａは、アセトアミノフェンにケイヒ末等の生薬を配合した内服薬で、頭痛、疼痛等の緩解、悪寒発熱時の解熱に用いられます。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は飲酒しないでください

4. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等が現れる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死症 （ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6 回服用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

○頭痛･歯痛･抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛･関節痛･神経痛･腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)･外傷痛の鎮痛

○悪寒･発熱時の解熱

成分と作用

3.0 g（大人１日最大量）中に次の成分を含んでいます。

成　　分	3.0 g 中	作　　用
アセトアミノフェン	0.9 g	熱を下げ、痛みをおさえます。
ケイヒ末	0.3 g	頭痛をおさえ、熱を下げます。
ショウキョウ末	0.1 g	頭痛をおさえ、熱を下げます。
カンゾウ末	0.3 g	筋肉の急激な緊張による痛みを緩和します。
デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量	賦形剤。

用法・用量

1 回量を次のとおりとし、1 日 3 回を限度とします。なるべく空腹時をさけて服用します。服用間隔は 4 時間以上おいてください。

年　　齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15 才以上）	1 包 1.0 g	3 回を限度
11 才以上 15 才未満	大人の 2/3	
11 才未満の小児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 11 才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1 包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2 日以内に服用してください。

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
4. 小児の手の届かない所に保管してください。
5. 長期保存しないでください。

見本

解熱鎮痛薬

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

○○薬局　解熱鎮痛剤８号Ａ

解熱鎮痛剤８号Ａは、アセトアミノフェンにカンゾウ末、シャクヤク末を配合した内服薬で、頭痛・疼痛等の緩解、悪寒発熱時の解熱に用いられます。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は飲酒しないでください

4. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等が現れる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死症 （ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6 回服用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

○頭痛･歯痛･抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛･関節痛･神経痛･腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)･外傷痛の鎮痛

○悪寒･発熱時の解熱

成分と作用

3.0 g（大人1日最大量）中に次の成分を含んでいます。

成　　分	3.0 g 中	作　　用
アセトアミノフェン	0.9 g	熱を下げ、痛みをおさえます。
カンゾウ末	0.5 g	筋肉の急激な緊張による痛みを緩和します。
シャクヤク末	0.5 g	腹筋等の緊張を緩和します。
デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量	賦形剤。

用法・用量

1 回量を次のとおりとし、1 日 2 回を限度とします。なるべく空腹時をさけて服用します。服用間隔は 6 時間以上おいてください。

年　　齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15 才以上）	1 包 1.5 g	2 回を限度
11 才以上 15 才未満	大人の 2/3	
11 才未満の小児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 11 才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1 包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2 日以内に服用してください。

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
4. 小児の手の届かない所に保管してください。
5. 長期保存しないでください。

見本

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

鼻炎用点鼻薬

○○薬局　ナファゾリン・クロルフェニラミン液 A

ナファゾリン・クロルフェニラミン液Aは、ナファゾリン塩酸塩とクロルフェニラミンマレイン酸塩のはたらきにより、くしゃみ・鼻水・鼻づまりに良く効く点鼻薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

(2) 3日間位使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

成分と作用

100 mL 中に次の成分を含んでいます。

成　　分	100 mL 中	作　　用
ナファゾリン塩酸塩	0.05 g	アレルギー性又は炎症性の粘膜充血、腫脹を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1 g	抗アレルギー作用を発揮します。
クロロブタノール	0.2 g	防腐剤。
グリセリン	5.0 mL	湿潤剤。
精製水	適量	溶剤。

用法・用量

年　　齢	用法・用量
成人（15才以上）	1日6回を限度として、3～4時間ごとに鼻汁をよくかんでから1～2回鼻腔内に噴霧する。
15才未満の小児	使用しないこと。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
(3) 点鼻用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4) 他の人と共用しないでください。

■ お問い合わせ先
○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
2. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
3. 小児の手の届かない所に保管してください。

見本

鼻炎用内服薬

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

○○薬局　鼻炎散１号Ａ

鼻炎散１号Ａは、塩酸プソイドエフェドリンに酒石酸アリメマジン、カフェイン、カンゾウ末を配合した急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による諸症状に奏効する内服薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

(1) 次の診断を受けた人。
　高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

(2) 次の症状のある人。
　前立腺肥大による排尿困難

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）、カンゾウを含む製剤

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります。）

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
　高熱、排尿困難、むくみ
(7) 次の診断を受けた人。
　緑内障、肝臓病、腎臓病
(8) モノアミン酸化酵素阻害剤（塩酸セレギリン等）で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等が現れる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6 日間服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

成分と作用

3.0 g（大人１日量）中に次の成分を含んでいます。

成　　分	3.0 g 中	作　　用
塩酸プソイドエフェドリン	0.18 g	鼻づまりを緩和します。
酒石酸アリメマジン	0.005 g	アレルギー症状をおさえます。
カフェイン	0.15 g	ねむけを防止します。
カンゾウ末	1.5 g	消炎作用、抗アレルギー作用を発揮します。
デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量	賦形剤。

用法・用量

1 回量を次のとおりとし、1 日 3 回、食後服用します。服用間隔は 4 時間以上おいてください。

年　　齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15 才以上）	1 包 1.0 g	3 回
11 才以上 15 才未満	大人の 2/3	
7 才以上 11 才未満	大人の 1/2	
3 才以上 7 才未満	大人の 1/3	
3 才未満の乳幼児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1 包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2 日以内に服用してください。

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
(2) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
3. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
5. 小児の手の届かない所に保管してください。

見本

鼻炎用内服薬

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

○○薬局　鼻炎散２号Ａ

鼻炎散２号Ａは、d-マレイン酸クロルフェニラミン・塩酸プソイドエフェドリンを主薬とし、これにグリチルリチン酸、ロートエキス、カフェインを配合した急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による諸症状に奏効する内服薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

(3) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）、カンゾウを含む製剤

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合には授乳を避けてください。

（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。）

5. 服用時は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ

(7) 次の診断を受けた人。
緑内障、肝臓病、腎臓病

(8) モノアミン酸化酵素阻害剤（塩酸セレギリン等）で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等が現れる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6 日間服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服

用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

成分と作用

3.0 g（大人１日量）中に次の成分を含んでいます。

成　　分	3.0 g 中	作　　用
d-マレイン酸クロルフェニラミン	0.006 g	アレルギー症状をおさえます。
ロートエキス散	0.6 g	鼻汁の分泌をおさえます。
塩酸プソイドエフェドリン	0.18 g	鼻づまりを緩和します。
グリチルリチン酸	0.2 g	消炎作用、抗アレルギー作用を発揮します。
カフェイン	0.15 g	ねむけを防止します。
デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量	賦形剤。

用法・用量

1 回量を次のとおりとし、1 日 3 回、食後服用します。服用間隔は 4 時間以上おいてください。

年　　齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15 才以上）	1 包 1.0 g	3 回
11 才以上 15 才未満	大人の 2/3	
7 才以上 11 才未満	大人の 1/2	
3 才以上 7 才未満	大人の 1/3	
3 才未満の乳幼児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1 包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2 日以内に服用してください。

■ お問い合わせ先
○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
(3) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
3. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
5. 小児の手の届かない所に保管してください。

見本

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

鎮咳去痰薬

○○薬局　鎮咳去痰剤５号Ｂ

鎮咳去痰剤５号Ｂは、ヒベンズ酸チペピジンにグアイフェネシン、塩酸プソイドエフェドリン、安息香酸ナトリウムカフェイン、キキョウ末、カンゾウ末を配合したせき・たんに用いる内服薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

(1) 次の診断を受けた人。
　高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

(2) 次の症状のある人
　前立腺肥大による排尿困難

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬

3. 服用時は飲酒しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
　高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
　腎臓病、緑内障
(9) モノアミン酸化酵素阻害剤（塩酸セレギリン等）で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、頭痛、神経過敏
その他	排尿困難

(2) 5～6 回服用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

せき、たん

成分と作用

4.5 g（大人１日量）中に次の成分を含んでいます。

成　　分	4.5 g 中	作　　用
ヒベンズ酸チペピジン	0.075 g	せきをしずめ、たんをきります。
グアイフェネシン	0.3 g	せきをしずめ、たんをきります。
塩酸プソイドエフェドリン	0.162 g	せきをしずめます。
安息香酸ナトリウムカフェイン	0.3 g	ねむけを防止します。
キキョウ末	1.0 g	せきをしずめ、たんをきります。
カンゾウ末	0.75 g	たんをきります。
デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量	賦形剤。

用法・用量

1回量を次のとおりとし、1日3回、4時間以上の間隔をおいて適宜服用します。

年　　齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包 1.5 g	3回
11才以上15才未満	大人の2/3	
8才以上11才未満	大人の1/2	
5才以上8才未満	大人の1/3	
3才以上5才未満	大人の1/4	
3才未満の乳幼児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
(2) 次の症状のある人
前立腺肥大による排尿困難

2. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
4. 小児の手の届かない所に保管してください。

見本

胃腸薬

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

○○薬局　健胃消化剤３号Ｂ

健胃消化剤３号Ｂは、乾燥酵母にジアスターゼ、パンクレアチンを配して、栄養補給や食欲増進、消化促進、整腸を図るとともに、これらに胃酸分泌促進のホミカエキス、苦味健胃薬のゲンチアナ末、脂質消化に役立つウルソデオキシコール酸、胃酸を調節する炭酸水素ナトリウムを加えた健胃消化剤です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の診断を受けた人。
　腎臓病
(6) 本剤の成分パンクレアチンにより過敏症を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	アレルギー症状（くしゃみ、流涙等）

(2) ２週間位服用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

胃弱、胸やけ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化促進、消化不良、食欲不振、食べ過ぎ、もたれ、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感

成分と作用

6.0ｇ（大人１日量）中に次の成分を含んでいます。

成　　分	6.0ｇ中	作　　用
乾燥酵母	2.0ｇ	ビタミンＢ群、タンパク質の補給をします。
ジアスターゼ	0.6ｇ	消化を助けます。
パンクレアチン	0.6ｇ	消化を助けます。
ゲンチアナ末	0.3ｇ	消化を促進させます。
ホミカエキス散	0.3ｇ	胃酸分泌を促進させます。
炭酸水素ナトリウム	2.0ｇ	胃酸を中和します。
ウルソデオキシコール酸	0.06ｇ	脂質を分散させ、消化させやすくします。
l-メントール	0.05ｇ	胃に爽快感を与えます。
デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量	賦形剤。

用法・用量

１回量を次のとおりとし、１日３回、食後に服用します。

年　　齢	１回量	１日服用回数
大人（15才以上）	１包2.0ｇ	３回
11才以上15才未満	大人の2/3	
8才以上11才未満	大人の1/2	
5才以上8才未満	大人の1/3	
5才未満の乳幼児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3) 服用の際は、粉末を吸い込まないように注意してください。また、多めの水で直ちに飲み下してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 1 包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2 日以内に服用してください。
(5) 長期保存しないでください。

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. **服用に際しては、説明文書をよく読んでください。**
2. **直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。**
3. **小児の手の届かない所に保管してください。**
4. **長期保存しないでください。**

見本

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

湿疹・皮膚炎用薬（副腎皮質ホルモン含有製剤）

○○薬局 ｺｰﾁ･C･P･V 軟膏

ｺｰﾁ･C･P･V 軟膏は、抗炎症・抗アレルギー・鎮痒作用のあるヒドロコルチゾン酢酸エステルに鎮痒作用のあるクロタミトンを加え、ゲル化炭化水素と白色ワセリンに練合した、湿疹･皮膚炎、ただれ、かぶれに用いる外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください

水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部

2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 乳幼児。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 患部が広範囲の人。
(8) 湿潤やただれのひどい人。
(9) 患部が顔面の人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

湿疹・皮膚炎、ただれ、かぶれ

成分と作用

100 g 中に次の成分を含んでいます。

成　　分	100 g 中	作　　用
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5 g	抗炎症作用、抗アレルギー作用、鎮痒作用を発揮します。
クロタミトン	5.0 g	かゆみをしずめます。
ゲル化炭化水素	50 g	基剤。
白色ワセリン	適量	基剤。

用法・用量

適宜、患部に塗布します。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. **次の部位には使用しないでください。**
   水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. **使用に際しては、説明文書をよく読んでください。**
3. **直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。**
4. **小児の手の届かない所に保管してください。**

見本

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

皮膚軟化・ひび・あかぎれ・しもやけ用薬

○○薬局　U20・ローション

U20・ローションは、がさがさになった皮ふに潤いを保たせる働きのある尿素を主薬にした、乾皮症や角化症に用いるローションタイプの外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 傷口又は赤く腫れている部位

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 湿潤やただれのひどい人。
(5) ひび割れのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたのように皮ふが剝がれる状態等

(2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

成分と作用

100 mL 中に次の成分を含んでいます。

成　　分	100 mL	作　　用
尿素	20.0 g	角質水分保持量増加作用及び角質溶解剝離作用を利用し、角化性皮膚疾患を改善します。
親水軟膏	25.0 g	基剤。
パラオキシ安息香酸メチル	0.013 g	防腐剤。
パラオキシ安息香酸プロピル	0.007 g	防腐剤。
精製水	適量	溶剤。

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦します。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. **次の部位には使用しないでください。**
   (1) 目の周囲、粘膜等。
   (2) 傷口又は赤くはれている部位。
2. **使用に際しては、説明文書をよく読んでください。**
3. **直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。**
4. **小児の手の届かない所に保管してください。**

見本

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

鎮痛消炎薬

○○薬局　インドメタシン 1%外用液

インドメタシン 1%外用液は、塗布した患部の筋肉や関節の痛みを緩解するインドメタシンを主薬とした、ローションタイプの外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

関節痛､筋肉痛､腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎、肘の痛み、打撲、ねんざ

成分と作用

100 mL 中に次の成分を含んでいます。

成　　分	100 mL 中	作　　用
インドメタシン	1.0 g	筋肉、関節痛を緩解します。
l-メントール	3.0 g	芳香・矯臭の働きをします。
プロピレングリコール	10.0 mL	溶解補助剤。
ベンザルコニウム塩化物液（10%）	0.1 mL	保存剤。
エタノール	80.0 mL	溶剤
精製水	適量	溶剤。

用法・用量

年　　齢	用法・用量
大人・小児（11 才以上）	1 日 4 回を限度として、適量を患部に塗布する。1 週間 50mL を限度とする。
11 才未満の小児	使用しないこと。

＜用法・用量に関連する注意＞
(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 11 才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。
(5) 1 週間あたり 50mL を超えて使用しないでください。
(6) ラップフィルム等通気の悪いものでおおわないでください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
5. 火気に近づけないでください。
6. 小児の手の届かない所に保管してください。

見本

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

みずむし・たむし用薬

○○薬局　ヨード･サリチル酸･フェノール精 A

ヨード・サリチル酸・フェノール精 A は、殺菌力のあるサリチル酸・アルコールに防腐・鎮痒力のあるフェノールと安息香酸を加え､更にヨードの殺菌性を期待して配合した病巣部位の剝離力をもつ、みずむし・たむし等に用いる液状外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 腎臓病の診断を受けた人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
(2) 湿疹
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部
(4) 化膿している部位。
(5) マーキュロクロム液と同一患部面

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 乳幼児。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 患部が顔面又は広範囲の人。
(6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等が現れる。

(2) 2 週間位使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

成分と作用

100 mL 中に次の成分を含んでいます。

成　　分	100 mL 中	作　　用
ヨードチンキ	20.0 mL	殺菌作用を発揮します。
サリチル酸	5.0 g	殺菌、防腐、鎮痒作用を発揮します。
液状フェノール	2.2 mL	鎮痒力を高めます。
安息香酸	8.0 g	局所の殺菌作用、サリチル酸とともに角質軟化作用を発揮します。
消毒用エタノール	適量	溶剤。

用法・用量

適宜、患部に塗布します。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(5) 外用にのみ使用してください。
(6) 患部及び皮膚に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼りつけないでください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 衣類に付着すると着色し、脱色しにくいので、ご注意ください。
(5) 火気に近づけないでください。

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 腎臓病の診断を受けた人。

2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
(2) 湿疹
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部
(4) 化膿している部位
(5) マーキュロクロム液と同一患部面

3. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
5. 火気に近づけないでください。
6. 小児の手の届かない所に保管してください。

見本

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

鎮痛消炎薬

○○薬局　インドメタシン 1%･M 軟膏

インドメタシン 1%･M 軟膏は､患部の筋肉や関節の痛みを緩解するインドメタシンを主薬とし、マクロゴール軟膏を基剤とした外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 湿疹、かぶれ、傷口
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

関節痛､筋肉痛､腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎、肘の痛み、打撲、ねんざ

成分と作用

100 g 中に次の成分を含んでいます。

成　　分	100 g 中	作　　用
インドメタシン	1.0 g	筋肉、関節痛を緩解します。
l-メントール	3.0 g	芳香・矯臭の働きをします。
マクロゴール 400	5.0 mL	溶解補助剤。
マクロゴール軟膏	適量	基剤。

用法・用量

年　　齢	用法・用量
大人・小児（11 才以上）	1 日 4 回を限度として、適量を患部に塗布する。1 週間あたり 50g を超えて使用しないこと。
11 才未満の小児	使用しないこと。

＜用法・用量に関連する注意＞
(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 11 才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。
(5) 1 週間あたり 50g を超えて使用しないでください。
(6) ラップフィルム等通気の悪いものでおおわないでください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 湿疹、かぶれ、傷口
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
4. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
5. 小児の手の届かない所に保管してください。

見本

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

湿疹・皮膚炎用薬（副腎皮質ホルモン含有製剤）

○○薬局　デキサメタゾン･C･P･V 軟膏

デキサメタゾン・C・P・V 軟膏は、抗炎症・抗アレルギー・鎮痒作用をもつ酢酸デキサメタゾンに鎮痒作用のあるクロタミトンを加え、ゲル化炭化水素と白色ワセリンに練合した、湿疹・皮膚炎等に用いる外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください

水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部

2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 乳幼児。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 患部が広範囲の人。
(8) 湿潤やただれのひどい人。
(9) 患部が顔面の人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

湿疹・皮膚炎、ただれ、かぶれ

成分と作用

100 g 中に次の成分を含んでいます。

成　　分	100 g 中	作　　用
酢酸デキサメタゾン	0.025 g	抗炎症作用、抗アレルギー作用、鎮痒作用を発揮します。
クロタミトン	5.0 g	かゆみをしずめます。
ゲル化炭化水素	50 g	基剤。
白色ワセリン	適量	基剤。

用法・用量

適宜、患部に塗布します。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

■ お問い合わせ先

○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. **次の部位には使用しないでください。**
   水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. **使用に際しては、説明文書をよく読んでください。**
3. **直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。**
4. **小児の手の届かない所に保管してください。**

見本

解熱鎮痛薬

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

○○薬局　解熱鎮痛剤 6 号カプセル

解熱鎮痛剤 6 号カプセルは、すぐれた抗炎症作用をもつイブプロフェンを主成分とした、各種の痛みや悪寒・発熱時の解熱に用いる大人用（15 才以上）のカプセル剤です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 15 才未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は飲酒しないでください

4. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
むくみ、血液の異常（出血傾向）
(8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
(9) 次の病気にかかったことのある人。
胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
(10) 抗凝血薬で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎
精神神経系	めまい
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死症 （ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿、蛋白尿等の症状があらわれる。
無菌性髄膜炎	首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性

	結合組織病の治療を受けている人で報告されている）
ぜんそく	

(2) 5～6 日間服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、下痢

効能・効果

○頭痛、歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり通・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
○悪寒・発熱時の解熱

成分と作用

1 カプセル（大人 1 回量）中に次の成分を含んでいます。

成　　分	1 カプセル中	作　　用
イブプロフェン	0.15 g	熱を下げ、痛みをおさえます。
デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量	賦形剤。

用法・用量

大人（15 才以上）1 回 1 カプセル、1 日 3 回を限度としてなるべく空腹時をさけて服用します。服用間隔は 4 時間以上おいてください。

年齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15 才以上）	1 カプセル	3 回を限度
15 才未満の小児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞
用法・用量を厳守してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

■ お問い合わせ先
○○薬局
管理薬剤師 ○○○○
受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
電　話　03（○○○○）○○○○　　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

製造販売元
○○薬局　〒○○○－○○○○　東京都新宿区四谷○丁目○番○号

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 15 才未満の小児。

2. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
3. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
4. 小児の手の届かない所に保管してください。